

# SPECIJALNA ĐUBRIVA



Dugogodišnja plastenička proizvodnja na istim lokacijama kao i upotreba vode za zalivanje sa povišenim sadržajem soli (tvrdva voda), može dovesti do podizanja pH i nakupljanja soli u zemljištu. Biljke koje se gaje na zemljištima sa visokom pH vrednošću zaostaju u porastu i ne mogu da postignu visoke prinose i dobar kvalitet plodova.

## Sulfacid LCN

- snižava pH vrednost zemljišta i oslobađa hraniva blokirana visokom pH reakcijom i visokom koncentracijom soli u zemljištu
- snižava pH vrednost rastvora za zalivanje
- pomaže bolje usvajanje azota, fosfora i drugih hraniva iz zemljišta i iz rastvora za zalivanje
- biljni stimulatori, koji se nalaze u ovom đubrивu, utiču na intenzivniji rad korena i na brži transport hraniva u list i plod biljaka

**Sulfacid LCN** se primenjuje ukoliko je pH vrednost zemljišta ili vode za zalivanje veća od 6,5.

## Sulfacid LCN

**Sulfacid LCN** je specijalno đubrivo koje se primenjuje kao korektor visoke pH vrednosti zemljišta i vode za zalivanje. Odlikuje se izuzetno efektnim delovanjem na zemljište i biljke.

### VREME I NAČIN PRIMENE

Primenjuje se jednom do dva puta, a po potrebi i više puta, kroz sistem kap po kap. Dodaje se u čistu vodu za zalivanje ili u rastvor vodotopivih đubriva.

### KOLIČINA PRIMENE

Primenjuje se u količini od 25 ml/ar ili 1 litar na 40 ari.

### SASTAV

- biljni stimulatori
- LCN agens
- 15% N
- 41% SO<sub>3</sub>



# SPECIJALNA ĐUBRIVA

Intenzivna povrtarska proizvodnja zahteva od gajenih biljaka usvajanje velikih količina hraniva. Ukoliko se u periodu vegetacije pojavi nedostatak određenih elemenata, biljke zaostaju u porastu, dolazi do pada prinosa i opada kvalitet plodova.

## KSC PHYT-actyl MIX

- brzo otklanja simptome nedostatka mikroelemenata na biljkama
- deluje brzo i efikasno
- oporavlja i regeneriše biljke koje se nalaze u stresnim uslovima (visoke temperature, hladnoća, oštećenja od pesticida i sl.)
- biljni stimulatori, koji se nalaze u ovom đubriva, značajno podstiču usvajanje mikroelemenata i magnezijuma od strane biljaka

## VREME I NAČIN PRIMENE

Primenjuje se po potrebi 2 – 3 puta u toku vegetacije preventivno ili kada se primete simptomi nedostatka magnezijuma i mikroelemenata na biljkama (hloroza i šarenilo najstarijeg ili najmlađeg lišća) kroz sistem kap po kap.



Za detaljne informacije o količinama, načinu i vremenu primene đubriva molimo Vas da se obratite stručnoj službi Timac Agro Balkans.