



PLAN ĐUBRENJA JABUČASTOG VOĆA

Navedeni planovi đubrenja su informativnog karaktera. Za detaljne informacije o količinama, načinu i vremenu primene đubriva, molimo vas da se obratite stručnoj službi Timac Agro Balkans.



PLAN ĐUBRENJA JABUČASTOG VOĆA



OSNOVNO ĐUBRENJE

Jesenja primena

- **EUROFERTIL TOP 51 (4:10:20)**
250 - 300 kg/ha
- **EURONATUR P 26 B (P₂O₅-26%, CaO 42%)**
100 - 150 kg/ha
- **AMINOR (organsko peletirano đubrivo)**
500 - 700 kg/ha (primena u zoni redova)
ili 1000 - 1500 kg/ha (primena po celoj površini)

Startno đubrenje u rano proleće

- **EUROFERTIL 67 N-Process (14:7:16)**
250 - 400 kg/ha

Cvetanje i zametanje plodova

- **SULFAMMO 25 MPPA ili SUFAMMO 30 N-process**
200 - 300 kg/ha

KSC Sulfacid



VODOTOPIVA ĐUBRIVA

Vreme primene	Đubrivo	Količina	Primena (kap po kap)	Količina KSC-a preko lista Folijarno
Bubrenje pupoljaka i početak cvetanja	KSC I (14:40:5)	200 - 300 g/ar	Jednom do dva puta	KSC I 3/5 kg/ha (1000 l vode) jednom
Vegetativni porast	KSC XX (19:20:20)	250 - 300 g/ar	Jednom do dva puta	KSC XX 3/5 kg/ha (1000 l vode) jednom do dva puta
	KSC MIX* (samostalno)	5 kg/ha	Dva do tri puta	
Zametnuti plodovi - promena boje ploda	KSC III (15:5:35)	300 - 500 g/ar	Tri do četiri puta (po potrebi i više)	KSC III 3/5 kg/ha (1000 l vode) jednom do dva puta
	KSC VII PERLA 15:0:9 +20 CaO (samostalno)	150 g/ar	Dva do tri puta	
Promena boje ploda i zrenje	KSC V	300 g/ar	Jednom do dva puta	KSC V 3/5 kg/ha (1000 l vode)

FOLIJARNO ĐUBRENJE BILJAKA

Proizvodnja sadnica i mladih zasada

- **FERTIACYL STARTER**
0,5 - 1% (50-100 ml /10 l vode) u fazi od tri – četiri lista – folijarno 1 - 2 puta sa razmakom od 15 dana.



FOLIJARNA PRIHRANA BILJAKA U RODU

- **FERTILEADER GOLD**
0,3 - 0,5%, (3 - 5 l /1000 l vode) – početak cvetanja jednom i posle berbe drugi put (**bolja oplodnja i zametanje plodova**)
- **FERTILEADER ELITE**
0,3 - 0,5% (3 - 5 l /1000 l vode) od početka cvetanja – na svakih 15 - 20 dana do kraja berbe (**čvrstoća i sjaj ploda**)
- **FERTILEADER VITAL**
0,3 - 0,5% (3 - 5 l /1000 l vode) - jednom do dva puta u toku vegetacije (**bolji rast, obojenost ploda i vitalnost biljaka**)



NAPOMENA

***KSC MIX** - Korektor nedostatka magnezijuma i mikroelemenata. Primenjuje se preventivno dva do tri puta u toku vegetacije ili kada se primeti nedostatak ovih hraniva na biljkama (šarenilo najstarijeg ili najmlađeg lista). Primenjuje se u količini od 1 kg za 20 ari.

KSC SULFACID - Korektor visoke pH vrednosti zemljišta i vode za zalivanje (pH > 6,5). Pomaže bolje usvajanje azota, fosfora i drugih hraniva iz zemljišta i dodaje se rastvoru vodotopivih đubriva u količini od 1 litar za 40 ari.