





Navedeni planovi đubrenja su informativnog karaktera. Za detaljne informacije o količinama, načinu i vremenu primene đubriva, molimo vas da se obratite stručnoj službi Timac Agro Balkans.



Temerinska 76
21000 Novi Sad
Tel: 021 47 27 020
www.rs.timacagro.com



PLAN ĐUBRENJA PARADAJZA



PLAN ĐUBRENJA PARADAJZA

OSNOVNO ĐUBRENJE

- **EUROFERTIL 67 N-Process (14:7:16) ili EUROFERTIL TOP 51 (4:10:20) 6 - 10 kg/ar**
- **PHYSIOMAX (76% CaCO₃ + 3 MgO) 3-4 kg/ar** (startna obezbeđenost biljaka kalcijumom i magnezijumom)
- **SULFAMMO 30 N-Process 2 - 3 kg/ar** gde nije postavljena folija u redove (azotna prihrana - posle zemetanja prvih plodova) ili 8 kg Eurofertil TOP + 3 kg Physiomas + 2 kg Sulfammo po aru, startno pred sadnju

PROIZVODNJA RASADA

- **FERTIACTYL STARTER 0,3% - 0,5%** (30 - 50 ml/10 litara vode) u fazi četiri prava lista folijarno ili
- **FERTIACTYL STARTER 0,5%** - rastvoriti 1 l FERTIACTYL STRARTER-a u 200 l vode i potopiti kontejnere ili čaše pred rasađivanje - vrlo uspešan način primene

FOLIJARNA PRIHRANA

- **FERTIACTYL STARTER 0,3% - 0,5%** (30 - 50 ml/10 l vode) nakon rasađivanja, posle prijema biljaka
- **FERTIACTYL STARTER 0,5% - 0,6%** (50 - 60 ml/10 l vode) 10 - 15 dana posle prvog tretmana
- **SEACTIV GOLD 0,5% - 0,6%** (50 - 60 ml/10 l vode) početak cvetanja - **bolja oplodnja i zemetanje plodova** (ili 1 l na 30 ari kroz sistem kap po kap)
- **SEACTIV ELITE 0,6% - 1%** (60 - 100 ml/10 l vode) posle formiranja prvih plodova na svakih 14 dana do kraja berbe - **čvrstoća i sjaj ploda** (ili 0,6 - 1 l/100 l vode)
- **SEACTIV VITAL 0,4% - 0,6%** (40 - 60 ml/10 l vode) jednom do dva puta u toku vegetacije - **oporavak i regeneracija biljaka**



VODOTOPIVA ĐUBRIVA

Vreme primene	Način primene	Đubrivo	Količina đubriva	Primena
7 - 10 dana posle rasađivanja	Kap po kap	KSC I (14:4:0:5)	150 - 200 g/ar	Jednom do dva puta
15 - 20 dana posle rasađivanja	Kap po kap	KSC II (23:5:5)	200 - 300 g/ar	Jednom
Vegetativni porast i zemetanje plodova	Kap po kap	KSC XX (19:20:20)	300 g/ar	Jednom do dva puta
		KSC SULFACID **	25 ml/ar	Jednom do dva puta - po potrebi i više puta (zemljište ili voda pH > 6,5)
		KSC VII PERLA (15:0:9 + 20 CaO)	150 g/ar	Po potrebi (odvojeno od ostalih đubriva)
Nalivanje i zrenje plodova	Kap po kap	KSC III (15:5:35)	400 - 600 g/ar	Nedeljno (dva puta po 300 g/ar)
		KSC VI *** (14:12:14)		
		KSC MIX * (15% MgO + mikroelementi)	50 g/ar	Jednom do tri puta tokom vegetacije (odvojeno od ostalih đubriva)
Berba plodova	Kap po kap	KSC VII PERLA (15:0:9 + 20 CaO)	150 - 200 g/ar	Jednom u 10 - 15 dana (odvojeno od ostalih đubriva)
		KSC V (8:16:42)	600 - 800 g/ar	Nedeljno (dva puta po 300 - 400 g/ar)
		KSC VII PERLA (15:0:9 + 20 CaO)	150 - 200 g/ar	Jednom u 10 - 15 dana (odvojeno od ostalih đubriva)

NAPOMENA

* **KSC MIX** - Korektor nedostatka magnezijuma i mikroelemenata. Primenjuje se preventivno dva do tri puta u toku vegetacije ili kada se primeti nedostatak ovih hraniva na biljkama (šarenilo najstarijeg ili najmlađeg lista). Primenjuje se u količini od 1 kg za 20 ari.

** **KSC SULFACID** - Korektor visoke pH vrednosti zemljišta i vode za zalivanje (pH > 6,5). Pomaže bolje usvajanje azota, fosfora i drugih hraniva iz zemljišta i dodaje se rastvoru vodotopivih đubriva u količini od 1 litar za 40 ari.

*** **KSC VI** (14:12:14) se preporučuje samostalno ili u kombinaciji sa **KSC III** tokom perioda sa visokim temperaturama vazduha.