



Navedeni planovi đubrenja su informativnog karaktera. Za detaljne informacije o količinama, načinu i vremenu primene đubriva, molimo vas da se obratite stručnoj službi Timac Agro Balkans.



Temerinska 76
21000 Novi Sad
Tel: 021 47 27 020
www.rs.timacagro.com



PLAN ĐUBRENJA CRVENE PAPRIKE



PLAN ĐUBRENJA CRVENE PAPRIKE

OSNOVNO ĐUBRENJE

- EUROFERTIL 67 N-Process (14:7:16) ili
EUROFERTIL TOP 51 (4:10:20)**
6 - 10 kg/ar
- PHYSIOMAX (76% CaCO₃ + 3 MgO)**
3 - 4 kg/ar (startna obezbeđenost biljaka kalcijumom i magnezijumom)
- SULFAMMO 30 N-Process**
2 - 3 kg/ar gde nije postavljena folija u redove (azotna prihrana - posle zametanja prvih plodova) ili **8 kg** Eurofertil TOP + **3 kg** Physiomax + **2 kg** Sulfammo po aru, startno pred sadnju

PROIZVODNJA RASADA

- FERTIACTYL STARTER**
0,3 - 0,5% (0,3 - 0,5 l/100 litara vode) u fazi četiri prava lista
- FERTIACTYL STARTER**
0,5% - 1% (0,5 - 1 l/100 l vode) pet do sedam dana pred rasadivanje (primenjuje se zalivanjem rasada rastvorom FERTIACTYL STARTER-a) - nakon zalivanja rasad isprati vodom.

FOLIJARNA PRIHRANA

- SEACTIV ELITE**
1% (1 l/100 l vode), nakon formiranja prvih plodova na svakih 14 dana (čvrstoća, sjaj i pravilan oblik ploda)
- SEACTIV GOLD**
0,3% - 0,5% (0,3 - 0,5 l/100 l vode) jednom do dva puta u toku vegetacije (bolja oplodnja i bolje zametanje ploda)

NAPOMENA

* **KSC SULFACID** - Korektor visoke pH vrednosti zemljišta i vode za zalivanje (pH > 6,5). Pomaže bolje usvajanje azota, fosfora i drugih hraniva iz zemljišta i dodaje se rastvoru vodotopivih đubriva u količini od 1 litar za 40 ar.

** **KSC MIX** - Korektor nedostatka magnezijuma i mikroelemenata. Primjenjuje se preventivno dva do tri puta u toku vegetacije ili kada se primeti nedostatak ovih hraniva na biljkama (šarenilo najstarijeg ili najmlađeg lista). Primjenjuje se u količini od 1 kg za 20 ar.

*** **KSC VI** (14:12:14) se preporučuje samostalno ili u kombinaciji sa KSC III tokom perioda sa visokim temperaturama vazduha.



sulfacid_{LCN}



VODOTOPIVA ĐUBRIVA I FOLIJARNA ISHRANA RASAĐENIH BILJAKA

Vreme primene	Način primene	Đubrivo	Količina đubriva	Primena
7 - 10 dana posle rasađivanja	Folijarno	FERTIACTYL STARTER	3 l/ha	Jednom (100 ml/10 l vode - leđna prskalica ili 3 l/330 l vode - traktorska prskalica)
10 - 15 dana posle rasađivanja	Kap po kap	KSC I (14:40:5) KSC II (23:5:5) ili KSC XX (19:20:20)	150 - 250 g/ar	Jednom
Vegetativni porast	Kap po kap	KSC SULFACID *	25 ml/ar	Jednom do dva puta - po potrebi i više puta (pH > 6,5) *
		KSC VII PERLA (15:0:9 + 20 CaO)	150 g/ar	Svakih 10 - 15 dana (odvojeno od ostalih đubriva)
Početak cvetanja i formiranje prvih plodova	Folijarno	FERTILEADER ELITE	3 l/ha	Svakih 15 dana do kraja berbe (100 ml/10 l vode - leđna prskalica ili 3 l/330 l vode - traktorska prskalica)
Razvoj plodova – do početka promene boje ploda	Kap po kap	KSC III (15:5:35) KSC VI *** (14:12:14)	250 - 300 g/ar	Nedeljno
		KSC MIX ** (15% MgO + mikroelementi)	50 g/ar	Jednom do tri puta tokom vegetacije (odvojeno od ostalih đubriva) **
		KSC VII PERLA (15:0:9 + 20 CaO)	150 g/ar	Svakih 10 - 15 dana (odvojeno od ostalih đubriva)
Od početka promene boje ploda do kraja berbe	Kap po kap	KSC V (8:16:42)	400 - 500 g/ar	Nedeljno
		KSC VII PERLA (15:0:9 + 20 CaO)	150 g/ar	Svakih 10 - 15 dana (odvojeno od ostalih đubriva)