


# PLAN ĐUBRENJA PAPRIKE (ZELENE, BELE, LJUTE)



Navedeni planovi đubrenja su informativnog karaktera. Za detaljne informacije o količinama, načinu i vremenu primene đubriva, molimo vas da se obratite stručnoj službi Timac Agro Balkans.



Temerinska 76  
21000 Novi Sad  
Tel: 021 47 27 020  
[www.rs.timacagro.com](http://www.rs.timacagro.com)



# PLAN ĐUBRENJA PAPRIKE (ZELENE, BELE, LJUTE)

## OSNOVNO ĐUBRENJE

- **EUROFERTIL 67 N-Process (14:7:16) ili EUROFERTIL TOP 51 (4:10:20)**  
6 - 10 kg/ar
- **PHYSIOMAX (76% CaCO<sub>3</sub> + 3 MgO)**  
3 - 4 kg/ar (startna obezbeđenost biljaka kalcijumom i magnezijumom)
- **SULFAMMO 30 N-Process**  
2 - 3 kg/ar gde nije postavljena folija u redove (azotna prihrana - posle zametanja prvih plodova) ili 8 kg Eurofertil TOP + 3 kg Physiomax + 2 kg Sulfammo po aru, startno pred sadnju

## PROIZVODNJA RASADA

- **SEACTIV STARTER**  
0,3% - 0,5% (0,3 - 0,5 l/100 litara vode) u fazi četiri prava lista folijarno ili
- **SEACTIV STARTER**  
0,5% (1 l/200 l vode) pet do sedam dana pred rasađivanje, način primene: zalivanjem rasada rastvorom FERTIACTYL STARTER-a ili potopiti kontejnere ili čaše pred rasađivanje (vrlo uspešan način primene)

## FOLIJARNA PRIHRANA

- **FERTIACTYL STARTER**  
0,5% (1 l/200 litara vode) 10 - 15 dana posle rasađivanja
- **SEACTIV ELITE**  
1% (1 l/100 l vode), nakon formiranja prvih plodova na svakih 14 dana (**čvrstoća, sjaj i pravilan oblik ploda**)
- **SEACTIV GOLD**  
0,3% - 0,5% (0,3 - 0,5 l/100 l vode) jednom do dva puta u toku vegetacije (**bolja oplodnja i bolje zametanje ploda**)
- **SEACTIV VITAL**  
0,4% - 0,6% (0,4 - 0,6 l/100 l vode) jednom do dva puta u toku vegetacije (**oporavak i regeneracija biljaka**)



## VODOTOPIVA ĐUBRIVA

Vreme primene	Način primene	Đubrivo	Količina đubriva	Primena
7 - 10 dana posle rasađivanja	Kap po kap	<b>FERTIACTYL STARTER</b>	150 ml/ar	<b>Jednom</b>
10 - 15 dana posle rasađivanja	Kap po kap	<b>KSC I</b> (14:40:5)	250 g/ar	<b>Jednom</b>
Vegetativni porast	Kap po kap	<b>KSC II</b> (23:5:5)	250 - 300 g/ar	<b>Više puta po potrebi</b>
Formiranje prvih plodova	Kap po kap	<b>KSC MIX *</b> (15% MgO + mikroelementi)	50 g/ar	<b>Jednom do tri puta tokom vegetacije</b> (odvojeno od ostalih đubriva)
		<b>KSC XX</b> (19:20:20)	250 - 300 g/ar	<b>Više puta po potrebi</b>
		<b>KSC VII PERLA</b> (15:0:9 + 20 CaO)	150 g/ar	<b>Svakih 10 - 15 dana</b> (odvojeno od ostalih đubriva)
Od početka do kraja berbe	Kap po kap	<b>KSC III</b> (15:5:35)	600 g/ar	<b>Nedeljno</b> (dva puta po 300 g/ar)
		<b>KSC VI ***</b> (14:12:14)		
		<b>KSC SULFACID **</b>	25 ml/ar	<b>Jednom do dva puta po potrebi i više puta</b> (zemljište ili voda pH > 6,5)
		<b>KSC VII PERLA</b> (15:0:9 + 20 CaO)	150 g/ar	<b>Svakih 10 - 15 dana</b> (odvojeno od ostalih đubriva)

## NAPOMENA

\* **KSC MIX** - Korektor nedostatka magnezijuma i mikroelemenata. Primenjuje se preventivno dva do tri puta u toku vegetacije ili kada se primeti nedostatak ovih hraniva na biljkama (šarenilo najstarijeg ili najmlađeg lista). Primenjuje se u količini od 1 kg za 20 ari.

\*\* **KSC SULFACID** - Korektor visoke pH vrednosti zemljišta i vode za zalivanje (pH > 6,5). Pomaže bolje usvajanje azota, fosfora i drugih hraniva iz zemljišta i dodaje se rastvoru vodotopivih đubriva u količini od 1 litara za 40 ari.

\*\*\* **KSC VI** (14:12:14) se preporučuje samostalno ili u kombinaciji sa **KSC III** tokom perioda sa visokim temperaturama vazduha.