


PLAN ĐUBRENJA KUPUSA I KARFIOLA



Navedeni planovi đubrenja su informativnog karaktera. Za detaljne informacije o količinama, načinu i vremenu primene đubriva, molimo vas da se obratite stručnoj službi Timac Agro Balkans.



Temerinska 76
21000 Novi Sad
Tel: 021 47 27 020
www.rs.timacagro.com



PLAN ĐUBRENJA KUPUSA I KARFIOLA

OSNOVNO ĐUBRENJE

- **PHYSIOMAX (76% CaCO₃ + 3 MgO)**
3 – 4 kg/ar u plasteničkoj proizvodnji ili 300 – 400 kg/ha za proizvodnju na otvorenom polju (primena po potrebi – za smanjenje kiselosti zemljišta i startnu obezbeđenost biljaka kalcijumom)
- + **EUROFERTIL TOP 51 (4:10:20)** ili **EUROFERTIL 67 N-PROCESS (14:7:16)**
5 – 7 kg/ar u plasteničkoj proizvodnji ili 500 – 700 kg/ha za proizvodnju na otvorenom polju
- **SULFAMMO 30 N-Process** ili **SULFAMMO 25 MPPA**
2 – 4 kg/ar u plasteničkoj proizvodnji ili 200 – 400 kg/ha za proizvodnju na otvorenom polju

FOLIJARNA PRIHRANA RASAĐENIH BILJAKA

- **FERTIACTYL STARTER** 7– 10 dana posle sadnje
0,5 – 1 l/100 l vode u plasteničkoj proizvodnji ili 3 – 5 l/ha za proizvodnju na otvorenom polju
- **SEACTIV GOLD** početak formiranja glavice
0,4 – 0,6 l/100 l vode u plasteničkoj proizvodnji ili 3 – 5 l/ha za proizvodnju na otvorenom polju
- **SEACTIV ELITE** 15 – 20 dana pre početka berbe
0,6 – 1 l/100 l vode u plasteničkoj proizvodnji ili dva puta po 3 l/ha za proizvodnju na otvorenom polju

Sulfacid_{crn}



VODOTOPIVA ĐUBRIVA

Vreme primene	Način primene	Đubrivo	Količina đubriva	Primena
5 - 10 dana posle rasađivanja	Kap po kap	KSC I (14:40:5)	200 - 250 g/ar ili 20-25 kg/ha	Jednom
Intenzivan porast	Kap po kap	KSC II (23:5:5)	250 g/ar ili 25 kg/ha	Jednom do dva puta
		KSC XX (19:20:20)		
		KSC MIX * (15% MgO + mikroelementi)	50 g/ar ili 5 kg/ha	Jednom do tri puta tokom vegetacije (odvojeno od ostalih đubriva) *
Od početka zavijanja glavice	Kap po kap	KSC III (15:5:35)	300 g/ar ili 30 kg/ha	Nedeljno
		KSC VI ** (14:12:14)		
		KSC VII PERLA (15:0:9 + 20 CaO)	150 g/ar	Nedeljno (odvojeno od ostalih đubriva)

NAPOMENA

* **KSC MIX** – Korektor nedostatka magnezijuma i mikroelemenata. Primenjuje se preventivno dva do tri puta u toku vegetacije ili kada se primeti nedostatak ovih hraniva na biljkama (šarenilo najstarijeg ili najmlađeg lista). Primenjuje se u količini od 1 kg za 20 ari.

KSC SULFACID – Korektor visoke pH vrednosti zemljišta i vode za zalivanje (pH > 6,5). Pomaže bolje usvajanje azota, fosfora i drugih hraniva iz zemljišta i dodaje se rastvoru vodotopivih đubriva u količini od 1 litar za 40 ari.

KSC VI (14:12:14) se preporučuje samostalno i u kombinaciji sa **KSC III**