





Navedeni planovi đubrenja su informativnog karaktera. Za detaljne informacije o količinama, načinu i vremenu primene đubriva, molimo vas da se obratite stručnoj službi Timac Agro Balkans.



Temerinska 76
21000 Novi Sad
Tel: 021 47 27 020
www.rs.timacagro.com



PLAN ĐUBRENJA KRSTAVCA



PLAN ĐUBRENJA KRASTAVCA

OSNOVNO ĐUBRENJE

- **EUROFERTIL 67 N-Process (14:7:16) ili EUROFERTIL TOP 51 (4:10:20)**
6 - 10 kg/ar
- **PHYSIOMAX (76% CaCO₃ + 3 MgO)**
3 - 4 kg/ar (startna obezbeđenost kalcijumom i magnezijumom)
- **SULFAMMO 30 N-Process**
2 - 3 kg/ar gde nije postavljena folija u redove (azotna prihrana – posle zamatanja prvih plodova) ili 8 kg Eurofertil TOP + 3 kg Physiomax + 2 kg Sulfammo po aru, startno pred sadnju

PROIZVODNJA RASADA

- **FERTIACTYL STARTER**
0,3% - 0,5% (0,3 – 0,5 l/100 l vode) u fazi tri prava lista folijarno ili
- **FERTIACTYL STARTER**
0,5% - rastvoriti 1 l FERTIACTYL STARTER-a u 200 l vode i potopiti kontejnere ili čaše pred rasađivanje - vrlo uspešan način primene

FOLIJARNA PRIHRANA POSAĐENIH BILJAKA U PLASTENIKU ILI OTVORENOM POLJU

- **FERTIACTYL STARTER**
0,3% - 0,5% (0,3 – 0,5 l/100 l vode) 5 - 7 dana posle rasađivanja
- **SEACTIV ELITE**
1% (1 l/100 l vode) posle formiranja prvih plodova na svakih 14 dana do kraja berbe
- **SEACTIV GOLD**
0,3% - 0,5% (0,3 – 0,5 l/100 l vode) jednom do dva puta u toku vegetacije ili 1 l na 30 ari kroz sistem kap po kap (**bolja oplodnja i bolje zamatanje ploda**)
- **SEACTIV VITAL**
0,4% - 0,6% (0,4 - 0,6 l/100 l vode) jednom do dva puta u toku vegetacije (**regeneracija i brži porast**)



VODOTOPIVA ĐUBRIVA

Vreme primene	Način primene	Đubrivo	Količina	Primena
Odmah po rasađivanju (prvo zalivanje)	Kap po kap	FERTIACTYL STARTER	150 ml/ar	Jednom
10 – 15 dana posle rasađivanja	Kap po kap	KSC I (14:40:5)	200 - 250 g/ar	Jednom
Vegetativni porast	Kap po kap	KSC II (23:5:5) ili KSC XX (19:20:20)	250 g/ar	Jednom
		KSC VII PERLA (15:0:9 + 20 CaO)	150 g/ar	Jednom do dva puta (odvojeno od ostalih đubriva - od početka cvetanja)
Formiranje prvih plodova	Kap po kap	KSC III (15:5:35)	300 g/ar	Jednom do dva puta
		KSC MIX * (15% MgO + mikroelementi)	50 g/ar	Jednom do tri puta tokom vegetacije
		KSC VII PERLA (15:0:9 + 20 CaO)	150 g/ar	Jednom (odvojeno od ostalih đubriva)
Intenzivan porast i puna berba plodova (do 2 m visine biljaka)	Kap po kap	KSC III (15:5:35)	700 - 1.000 g/ar	Nedeljno (100 - 150 gr/ar svakog dana)
		KSC VI *** (14:12:14)		
		KSC VII PERLA (15:0:9 + 20 CaO)	150 g/ar	Jednom nedeljno (odvojeno od ostalih đubriva)
Puna berba plodova (preko 2 m visine)	Kap po kap	KSC V (8:16:42) + KSC II (23:5:5)	1.000 + 500 g/ar	Nedeljno (150 - 200 gr/ar svakog dana)
		KSC Sulfacid **	25 ml/ar	Jednom do dva puta - po potrebi i više puta (zemljište ili voda pH > 6,5)
		KSC VII PERLA (15:0:9 + 20 CaO)	150 - 200 g/ar	Jednom nedeljno (odvojeno od ostalih đubriva)

NAPOMENA

* **KSC MIX** - Korektor nedostatka magnezijuma i mikroelemenata. Primenjuje se preventivno dva do tri puta u toku vegetacije ili kada se primeti nedostatak ovih hraniva na biljkama (šarenilo najstarijeg ili najmlađeg lista). Primenjuje se u količini od 1 kg za 20 ari.

** **KSC SULFACID** - Korektor visoke pH vrednosti zemljišta i vode za zalivanje (pH > 6,5). Pomaže bolje usvajanje azota, fosfora i drugih hraniva iz zemljišta i dodaje se rastvoru vodotopivih đubriva u količini od 1 litar za 40 ari.

*** **KSC VI (14:12:14)** se preporučuje samostalno ili u kombinaciji sa **KSC III** tokom perioda sa visokim temperaturama vazduha.