



# PLAN ĐUBRENJA JAGODE



Navedeni planovi đubrenja su informativnog karaktera. Za detaljne informacije o količinama, načinu i vremenu primene đubriva, molimo vas da se obratite stručnoj službi Timac Agro Balkans.

 **Timac AGRO**  
Balkans



Temerinska 76  
21000 Novi Sad  
Tel: 021 47 27 020  
[www.rs.timacagro.com](http://www.rs.timacagro.com)



 **Timac AGRO**  
Balkans

# PLAN ĐUBRENJA JAGODE

## OSNOVNO ĐUBRENJE

- EUROFERTIL 67 N-Process (14:7:16)** ili  
**EUROFERTIL TOP 51 (4:10:20)**  
5 - 7 kg/ar

- PHYSIMAX (76% CaCO<sub>3</sub> + 3 MgO)**  
3 - 4 kg/ar (startna obezbeđenost kalcijumom i magnezijumom, smanjuje kiselost zemljišta)

- SULFAMMO 30 N-Process** 2 - 3 kg/ar  
**Azotna prihrana** - pre cvetanja gde nije postavljena folija u redove ili pre postavljanja malč folije  
**Startno đubrenje** - istovremeno sa đubriva EUROFERTIL TOP i PHYSIMAX



## PROIZVODNJA RASADA (živića)

- FERTIACTYL STARTER**  
0,3% - 0,5% (30 - 50 ml/10 l vode) folijarno u fazi tri do četiri prava lista
- FERTIACTYL STARTER**  
0,5% - rastvoriti 1 l FERTIACTYL STARTER-a u 200 l vode i potopiti živiće, kontejnere ili čaše pred rasađivanje - vrlo uspešan način primene



## FOLIJARNA PRIHRANA BILJAKA NA POLJU

- FERTIACTYL STARTER**  
0,6% - 1% (60 - 100 ml/10 l vode) nakon rasađivanja i posle prijema biljaka (**jači koren i cvetanje**)
- SEACTIV GOLD**  
0,5% - 0,6% (50 - 60 ml/10 l vode) početak cvetanja ili 1 l na 30 ari kroz sistem kap po kap (**bolja oplođnja i zametanje plodova**)
- SEACTIV ELITE**  
0,6% - 1% (60 - 100 ml/10 l vode) od početka cvetanja na svakih 15 dana do kraja berbe (**čvrstoća i sjaj ploda**)
- SEACTIV VITAL**  
0,4% - 0,6% (40 - 60 ml/10 l vode) jednom do dva puta u toku vegetacije (**vitalnost, oporavak i regeneracija biljaka**)



## VODOTOPIVA ĐUBRIVA

Vreme primene	Način primene	Đubrivo	Količina	Primena	Količina KSC-a preko lista (folijarno)
7 - 10 dana posle rasadivanja (ili početak vegetacije kod zasnovanih zasada)	Kap po kap	<b>KSC I</b> (14:40:5)	150 - 200 g/ar	<b>Jednom do dva puta</b>	<b>KSC I</b> 0,3% (30 g/10 l vode)
15 - 20 dana posle rasadivanja (ili početak vegetacije kod zasnovanih zasada)	Kap po kap	<b>KSC II</b> (23:5:5)	200 - 300 g/ar	<b>Jednom</b>	<b>KSC I</b> 0,3 - 0,5% (30 - 50 g/10 l vode)
Vegetativni porast	Kap po kap	<b>KSC XX</b> (19:20:20)	300 g/ar	<b>Jednom do dva puta</b>	<b>KSC II + KSC III</b> 0,3 - 0,5% (30 - 50 g/10 l vode)
		<b>KSC VII PERLA</b> (15:0:9 + 20 CaO)	150 g/ar	<b>Jednom</b> (odvojeno od ostalih đubriva)	
Zametnuti plodovi - prva polovina berbe	Kap po kap	<b>KSC III</b> (15:5:35)	300 g/ar	<b>Nedeljno</b>	<b>KSC III</b> 0,5% (50 g/10 l vode)
		<b>KSC VI **</b> (14:12:14)			
		<b>KSC MIX *</b> (15% MgO + mikroelementi)	50 g/ar	<b>Jednom do tri puta tokom vegetacije</b> (odvojeno od ostalih đubriva) *	
Druga polovina berbe - do kraja berbe (ubrzano zrenje)	Kap po kap	<b>KSC VII PERLA</b> (15:0:9 + 20 CaO)	150 g/ar	<b>Nedeljno</b> (odvojeno od ostalih đubriva)	<b>KSC V</b> 0,5% (50 g/10 l vode)
		<b>KSC III</b> (15:5:35) ili <b>KSC V</b> (8:16:42)	300 - 400 g/ar	<b>Nedeljno</b>	
		<b>KSC VII PERLA</b> (15:0:9 + 20 CaO)	150 g/ar	<b>Nedeljno</b> (odvojeno od ostalih đubriva)	

## NAPOMENA

\***NOVO - KSC MIX** - Korektor nedostatka magnezijuma i mikroelemenata. Primjenjuje se preventivno dva do tri puta u toku vegetacije ili kada se primeti nedostatak ovih hraniva na biljkama (šarenilo najstarije ili najmlađeg lista). Primjenjuje se u količini od 1 kg za 20 ari.

**NOVO - KSC SULFACID** - Korektor visoke pH vrednosti zemljišta i vode za zalivanje (pH > 6,5). Pomaže bolje usvajanje azota, fosfora i drugih hraniva iz zemljišta i dodaje se rastvoru vodotopivih đubriva u količini od 1 litar za 40 ari.

\*\* **KSC VI** (14:12:14) se preporučuje samostalno ili u kombinaciji sa **KSC III** tokom perioda sa visokim temperaturama vazduha.